

Στοιχεία Κατηγορηματικής Λογικής

Διδάσκοντες: **Φ. Αφράτη, Δ. Φωτάκης**
Επιμέλεια διαφανειών: **Δ. Φωτάκης**

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
και Μηχανικών Υπολογιστών

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο



Κατηγορηματική Λογική

- **Προτασιακή Λογική:** πλαίσιο διατύπωσης και μελέτης επιχειρημάτων για **πεπερασμένο πλήθος «λογικών αντικειμένων».**
 - «Λογικό αντικείμενο»: παίρνει τιμές αλήθειας, Α ή Ψ.
 - Διαφορετικά, «μη λογικό αντικείμενο», π.χ. αριθμοί, σύνολα, ...
- **Κατηγορηματική (ή Πρωτοβάθμια) Λογική:** πλαίσιο διατύπωσης και μελέτης επιχειρημάτων για:
 - «Μη λογικά αντικείμενα» (αριθμούς, σύνολα, γραφήματα).
 - **Πράξεις (συναρτήσεις)** και **σχέσεις (κατηγορήματα)** μεταξύ τους.
 - Άπειρο πλήθος αντικειμένων: **ποσοδείκτες**.
 - «Κάθε φυσικός αριθμός είναι είτε άρτιος είτε περιττός».
 - «Υπάρχει σύνολο που είναι υποσύνολο κάθε συνόλου».
 - Τύποι ΚΛ είναι **«λογικά αντικείμενα»** που μπορεί να αφορούν / αναφέρονται σε **«μη λογικά αντικείμενα»**.

Συντακτικό Πρωτοβάθμιας Γλώσσας

- «Λογικά Σύμβολα»: έχουν συγκεκριμένη ερμηνεία, λειτουργούν πάντα με τον ίδιο τρόπο:
 - Λογικοί σύνδεσμοι: \neg , \wedge , \vee , \rightarrow , \leftrightarrow
 - Ποσοδείκτες: \forall και \exists
 - \forall (για κάθε): **σύζευξη** για όλα στοιχεία δομής (δυνάμει άπειρη).
 - \exists (υπάρχει): **διάζευξη** για όλα στοιχεία δομής (δυνάμει άπειρη).
 - Ισότητα = : ελέγχει **ταύτιση**.
 - Λειτουργεί ως **κατηγορηματικό σύμβολο**, αλλά εντάσσεται στα «λογικά σύμβολα» γιατί έχει συγκεκριμένη ερμηνεία.
 - Σημεία στίξης και παρενθέσεις.

Συντακτικό Πρωτοβάθμιας Γλώσσας

- «Μη Λογικά Σύμβολα»: ερμηνεία καθορίζει λειτουργία τους.
 - Ορισμός γλώσσας και έλεγχος αλήθειας απαιτούν ερμηνεία τους (πολυσημία, εκφραστικότητα!).
 - Μεταβλητές x, y, z, \dots
 - Ερμηνεία καθορίζει πεδίο ορισμού μεταβλητών: **σύμπαν**.
 - **Ελεύθερες**: τιμή τους καθορίζεται με **αποτίμηση**.
 - **Δεσμευμένες**: ποσοδείκτες καθορίζουν «συμπεριφορά» τους.
 - Σύμβολα σταθερών c, c_1, c_2, \dots
 - Αναπαριστούν **συμβολικά συγκεκριμένες τιμές** σύμπαντος.
 - Ερμηνεία καθορίζει **τιμή** κάθε συμβόλου σταθεράς.
 - Πρόκειται για 0-θέσια συναρτησιακά σύμβολα.

Συντακτικό Πρωτοβάθμιας Γλώσσας

- «Μη Λογικά Σύμβολα»: ερμηνεία καθορίζει λειτουργία τους.
 - Συναρτησιακά σύμβολα f , g , h , ..., με αντίστοιχο πλήθος ορισμάτων.
 - Π.χ. f είναι 2-θέσιο συναρτησιακό σύμβολο.
 - Εκφράζουν «**πράξεις**» μεταξύ στοιχείων σύμπαντος.
 - Ερμηνεία καθορίζει πεδίο ορισμού, πεδίο τιμών, και **Λειτουργία**.
 - Κατηγορηματικά σύμβολα P , Q , R , ..., με αντίστοιχο πλήθος ορισμάτων.
 - Π.χ. Q είναι 2-μελές κατηγορηματικό σύμβολο.
 - Εκφράζουν «**σχέσεις**» μεταξύ στοιχείων σύμπαντος.
 - Ερμηνεία καθορίζει πεδίο ορισμού και **Λειτουργία**.
 - Κατηγορηματικά σύμβολα υλοποιούν «μετάβαση» από «μη λογικό» σε «λογικό» κόσμο.
 - $Q(x, y)$ δέχεται δύο στοιχεία σύμπαντος (π.χ. αριθμούς), «ελέγχει» αν σχετίζονται με συγκεκριμένο τρόπο, και «απαντά» Α ή Ψ.

Δομή Τύπων Πρωτοβάθμιας Γλώσσας: 'Όροι

- 'Όροι παίρνουν **τιμές στο σύμπαν**.
 - Μεταβλητές x, y, z, \dots
 - Σταθερές c, c_1, c_2, \dots
 - Οτιδήποτε προκύπτει από (σωστή) **εφαρμογή συναρτησιακού συμβόλου** σε ήδη σχηματισμένους όρους.
 - Π.χ. $f(x, y), f(g(x), c), g(f(x, g(y))), c \oplus f(x, y), \dots$
- Δομή αναπαρίσταται με δενδροδιάγραμμα, ιδιότητες αποδεικνύονται με δομική επαγωγή.
- 'Όροι **δεν** μπορούν να συνδέονται με **λογικούς συνδέσμους**!

Δομή Τύπων Πρωτοβάθμιας Γλώσσας: Τύποι

- Ατομικοί τύποι προκύπτουν εφαρμόζοντας ισότητα ή κατηγορηματικό σύμβολο σε όρους.
 - Π.χ. $x = c$, $f(x, y) = g(c)$, $Q(x, y)$, $R(f(x, y))$, ...
 - «Λογικές» τιμές A ή Ψ , βασικά («λογικά») δομικά στοιχεία τύπων.
- Τύπος:
 - Ατομικός τύπος (βάση επαγωγικού ορισμού).
 - Εφαρμογή λογικών συνδέσμων σε τύπους Φ , Ψ :
 $\neg\Phi$, $\Phi \vee \Psi$, $\Phi \wedge \Psi$, $\Phi \rightarrow \Psi$, $\Phi \leftrightarrow \Psi$.
 - Εφαρμογή ποσοδεικτών σε τύπο Φ : $\exists x\Phi$, $\forall x\Phi$.
- Δομή αναπαρίσταται με δενδροδιάγραμμα, ιδιότητες αποδεικνύονται με μαθηματική επαγωγή.
- Τύποι: τιμή A ή Ψ . Όροι: τιμές στο σύμπαν.

Δομή Τύπων Πρωτοβάθμιας Γλώσσας

«Λογικό» Μέρος

τύποι	εφαρμογή ποσοδεικτών, λογικών συνδέσμων σε ατομικούς τύπους
ατομικοί τύποι	εφαρμογή ισότητας, κατηγορημάτων σε όρους
όροι	εφαρμογή συναρτήσεων μεταβλητές, σταθερές

«Μη Λογικό» Μέρος

Παράδειγμα

- Ποιά από τα παρακάτω είναι όροι ή τύποι (ή συντακτικό λάθος);
- $Q(f(c, y), P(x))$ $g(Q(c, y), P(y))$
 - $Q(f(c, y), \textcolor{red}{P(x)})$ $\textcolor{red}{g(Q(c, y), P(y))}$
 - $\forall x P(g(x))$ $\forall x g(P(x))$
 - $\forall x P(g(x)) (\tau)$ $\forall x \textcolor{red}{g}(P(x))$
 - $x = y \vee c$ $x = f(y, c)$
 - $x = \textcolor{red}{y} \vee c$ $x = f(y, c) (\sigma\tau)$
 - $\forall x P(P(x))$ $\exists x Q(x, c_1)$
 - $\forall x P(\textcolor{red}{P(x)})$ $\exists x Q(x, c_1) (\tau)$
 - $\exists x (P(x) \vee \neg \forall x P(x, x))$ $\exists x (x = y \wedge Q(x, y))$
 - $\exists x (\textcolor{red}{P(x)} \vee \neg \forall x \textcolor{red}{P(x, x)})$ $\exists x (x = y \wedge Q(x, y)) (\tau)$

Παράδειγμα

- Ποιά από τα παρακάτω είναι όροι ή τύποι (ή συντακτικό λάθος);
- $P(x) \vee g(x)$ $\forall y \exists x (Q(x, g(y)) \vee P(g(x)))$
 - $P(x) \vee \textcolor{red}{g(x)}$ $\forall y \exists x (Q(x, g(y)) \vee P(g(x))) \text{ (τ)}$
 - $\exists x Q(x, c)$ $\forall \exists x Q(x, y)$
 - $\exists x Q(x, c) \text{ (τ)}$ $\forall \exists x Q(x, y)$
 - $x + y = x * y$ $(3 + 1) + 10$
 - $x + y = x * y \text{ (στ)}$ $(3 + 1) + 10 \text{ (ορ)}$
 - $\forall x \exists y (x + y = x * y)$ $\forall x \exists y (P(x) \vee (Q(x, y) \rightarrow \neg P(x)))$
 - $\forall x \exists y (x + y = x * y) \text{ (τ)}$ $\forall x \exists y (P(x) \vee (Q(x, y) \rightarrow \neg P(x))) \text{ (τ)}$

Ελεύθερες και Δεσμευμένες Μεταβλητές

- Δεσμευμένη **εμφάνιση** μεταβλητής: εμπίπτει σε **πεδίο εφαρμογής** ποσοδείκτη.
 - Ποσοδείκτης καθορίζει πως αποτιμάται η μεταβλητή.
 - $\forall (\exists)$: σύζευξη (διάζευξη) για όλες τιμές σύμπαντος.
 - Δεσμευμένες εμφανίσεις μεταβλητής x που εμπίπτουν **στον ίδιο ποσοδείκτη**: «ίδια» δεσμευμένη μεταβλητή.
 - Δεσμευμένες εμφανίσεις μεταβλητής x που εμπίπτουν **σε διαφορετικό ποσοδείκτη**: «διαφορετικές» δεσμευμένες μεταβλητές.
- Ελεύθερη **εμφάνιση** μεταβλητής: **δεν** εμπίπτει σε πεδίο εφαρμογής κάποιου **ποσοδείκτη**.
 - Μπορεί να έχει οποιαδήποτε τιμή, η οποία καθορίζεται από αποτίμηση.
 - 'Όλες οι ελεύθερες εμφανίσεις μεταβλητής x : «ίδια» μεταβλητή.
- $\exists \mathbf{x}(P(\mathbf{x}) \wedge Q(\mathbf{x}, \mathbf{y})) \wedge P(\mathbf{y})$ και $\exists \mathbf{x}P(\mathbf{x}) \wedge \exists \mathbf{x}Q(\mathbf{x}, \mathbf{y}) \wedge P(\mathbf{y})$

Ελεύθερες και Δεσμευμένες Μεταβλητές

- **Ελεύθερη μεταβλητή** αν εμφανίζεται ελεύθερη (τουλ. μία φορά), διαφορετικά **δεσμευμένη**.
- **Πρόταση:** τύπος χωρίς ελεύθερες μεταβλητές.
Τιμή αλήθειας πρόταση δεν εξαρτάται από αποτίμηση.

Ελεύθερες και Δεσμευμένες Μεταβλητές

- Ποιές εμφανίσεις μεταβλητών είναι **ελεύθερες** και ποιές **δεσμευμένες**;
 - $\forall y \exists x (P(x, f(y)) \vee Q(x))$ $\forall x \exists y (Q(x) \vee P(x, y)) \rightarrow \neg Q(x)$
 - $\forall \textcolor{red}{y} \exists \textcolor{blue}{x} (P(\textcolor{blue}{x}, f(\textcolor{red}{y})) \vee Q(\textcolor{blue}{x}))$ $\forall \textcolor{blue}{x} \exists \textcolor{red}{y} (Q(\textcolor{blue}{x}) \vee P(\textcolor{blue}{x}, \textcolor{red}{y})) \rightarrow \neg Q(\textcolor{blue}{x})$
 - $\forall x P(x, y) \rightarrow \forall z P(z, x)$ $Q(z) \rightarrow \neg \forall x \forall y P(x, y)$
 - $\forall \textcolor{blue}{x} P(\textcolor{blue}{x}, \textcolor{red}{y}) \rightarrow \forall \textcolor{blue}{z} P(\textcolor{blue}{z}, \textcolor{blue}{x})$ $Q(\textcolor{blue}{z}) \rightarrow \neg \forall \textcolor{blue}{x} \forall \textcolor{red}{y} P(\textcolor{blue}{x}, \textcolor{red}{y})$
 - $\forall x Q(x) \rightarrow \forall y P(x, y)$ $\forall x \forall y \forall z (x > y \wedge y > z) \rightarrow \exists w (x > w)$
 - $\forall \textcolor{blue}{x} Q(\textcolor{blue}{x}) \rightarrow \forall \textcolor{red}{y} P(\textcolor{blue}{x}, \textcolor{red}{y})$ $\forall \textcolor{blue}{x} \forall \textcolor{red}{y} \forall \textcolor{blue}{z} (\textcolor{blue}{x} > \textcolor{red}{y} \wedge \textcolor{red}{y} > \textcolor{blue}{z}) \rightarrow \exists \textcolor{blue}{w} (\textcolor{blue}{x} > \textcolor{blue}{w})$
 - $y + x = x + y$ $\exists y (x + x = x * y)$
 - $\textcolor{blue}{y} + \textcolor{blue}{x} = \textcolor{blue}{x} + \textcolor{blue}{y}$ $\exists \textcolor{red}{y} (\textcolor{blue}{x} + \textcolor{blue}{x} = \textcolor{blue}{x} * \textcolor{blue}{y})$
- Μετονομασία **όλων** εμφανίσεων της «**ίδιας**» μεταβλητής διατηρεί **απαράλλακτο** τον τύπο: **αλφαριθμητική παραλλαγή**.

Ελεύθερες και Δεσμευμένες Μεταβλητές

- Ελεύθερη μεταβλητή αν εμφανίζεται ελεύθερη (τουλ. μία φορά), διαφορετικά δεσμευμένη.
- Πρόταση: τύπος χωρίς ελεύθερες μεταβλητές.
Τιμή αλήθειας πρόταση δεν εξαρτάται από αποτίμηση.
- Ελεύθερες μεταβλητές χρειάζονται «**αρχικοποίηση**».
 - Όλες οι ελεύθερες εμφανίσεις μιας μεταβλητής «**αρχικοποιούνται**» στην **ΐδια τιμή** (αυτή που καθορίζεται από **αποτίμηση**).
- Δεσμευμένες εμφανίσεις μεταβλητών **δεν** χρειάζονται «**αρχικοποίηση**».
 - Ποσοδείκτης που τις δεσμεύει καθορίζει αποτίμηση.
 - Μεταβλητές που δεσμεύονται από **διαφορετικούς ποσοδείκτες** είναι «**διαφορετικές**» (ακόμη και αν έχουν το ίδιο όνομα).

Ερμηνεία (ή Δομή)

- Ορισμός Πρωτοβάθμιας Γλώσσας **απαιτεί ερμηνεία** «μη λογικών» συμβόλων.
- Ερμηνεία (ή δομή) Α καθορίζει:
 - **Σύμπαν $|A|$** : πεδίο ορισμού σταθερών, μεταβλητών, συναρτήσεων, και κατηγορημάτων.
 - $|A|$ είναι το **σύνολο αντικειμένων** στα οποία αναφερόμαστε.
 - Ορισμός **συναρτησιακών** συμβόλων: «**πράξη**» που αντιστοιχούν.
 - Τι «επιστρέφει» κάθε συναρτησιακό σύμβολο.
 - Ορισμός **κατηγορηματικών** συμβόλων: «**σχέση**» που αντιστοιχούν.
 - Πότε κατηγορηματικό σύμβολο «επιστρέφει» Α και πότε Ψ.
 - Ορισμός **τιμής** για κάθε σύμβολο **σταθεράς**.

Παραδείγματα Ερμηνείας

- Γλώσσα Θεωρίας Αριθμών:
 - Σύμπαν **N** (φυσικοί αριθμοί)
 - Σταθερά **0** (αποτ. στο 0), συναρτησιακά **⊕** (πρόσθεση),
⊗ (πολλαπλασιασμός), και **'** (επόμενος φυσικός),
 - κατηγορηματικό **<** (αντ. σε σχέση $x < y$).
- Γλώσσα Θεωρίας Συνόλων:
 - Σύμπαν **δυναμοσύνολο συνόλου U** (ή σύνολο με στοιχεία σύνολα)
 - Σταθερά **∅** (αποτ. στο \emptyset),
 - κατηγορηματικό **\subseteq** (αντ. σε σχέση $x \subseteq y$).

Εναλλαγή Ποσοδεικτών

$\forall x \exists y P(x, y)$

$P(x, y)$: ο **χ** **θαυμάζει** τον **γ** **όλοι** **θαυμάζουν** κάποιον (**όχι** αναγκαία τον **ίδιο**, μπορεί τον **εαυτό** τους).

$\forall x \exists y P(y, x)$

όλοι **θαυμάζονται** από κάποιον (**όχι** αναγκαία από τον **ίδιο**, μπορεί από τον **εαυτό** τους).

$\forall x \forall y P(x, y)$
 $\forall x \forall y P(y, x)$

όλοι **θαυμάζουν** τους πάντες (**και** τον **εαυτό** τους).

$\exists x \forall y P(x, y)$

υπάρχει κάποιος που τους **θαυμάζει** όλους (**και** εαυτό του).

$\exists x \forall y P(y, x)$

υπάρχει κάποιος που τον **θαυμάζουν** όλοι (**και** εαυτός του).

$\exists x \exists y P(x, y)$
 $\exists x \exists y P(y, x)$

υπάρχει **ζευγάρι** (**όχι** αναγκαία διαφορετικών) που **ο ένας** **θαυμάζει** τον **άλλο**.

$P(x, y)$: **χ** \leq **γ** **κάθε** **αριθμός** **έχει** κάποιον **μεγαλύτερο** ή **ίσο** του.

κάθε **αριθμός** **έχει** κάποιον **μικρότερο** ή **ίσο** του.

για **κάθε** **ζευγάρι** αριθμών, ο **ένας** είναι μικρότερος ή **ίσος** του **άλλου**.

υπάρχει **αριθμός** **μικρότερος** ή **ίσος** **όλων** (**κάτω** φράγμα).

υπάρχει **αριθμός** **μεγαλύτερος** ή **ίσος** **όλων** (**άνω** φράγμα)

υπάρχουν **αριθμοί** που **ο ένας** είναι **μικρότερος** ή **ίσος** του **άλλου**.

$$\neg \exists x \varphi(x) \equiv \forall x \neg \varphi(x)$$

$$\neg \forall x \varphi(x) \equiv \exists x \neg \varphi(x)$$

Εκφραστικότητα Πρωτοβάθμιας Γλώσσας

- Δεδομένης ερμηνείας (π.χ. φυσικοί αριθμοί, σύνολα, γραφήματα), διατύπωση προτάσεων – ιδιοτήτων σε πρωτοβάθμια γλώσσα.
- Όλοι οι άνθρωποι θαυμάζουν κάποιον άλλο. $\forall x \exists y (x \neq y \wedge P(x, y))$
 $\neg \exists x \forall y (x \neq y \rightarrow \neg P(x, y))$
- Υπάρχει κάποιος που δεν θαυμάζει κανέναν άλλο. $\exists x \forall y (x \neq y \rightarrow \neg P(x, y))$
- Υπάρχει κάποιος που θαυμάζει τον εαυτό του και μόνον αυτόν. $\exists x (P(x, x) \wedge \forall y (P(x, y) \rightarrow x = y))$
- Όλοι θαυμάζονται από κάποιον άλλο. $\forall x \exists y (x \neq y \wedge P(y, x))$
- Υπάρχει κάποιος που θαυμάζει όλους τους άλλους. $\exists x \forall y (x \neq y \rightarrow P(x, y))$
- Υπάρχει κάποιος που δεν θαυμάζει κανέναν. $\exists x \forall y \neg P(x, y)$
- Δεν υπάρχει κανένας άνθρωπος που να τον θαυμάζουν όλοι οι άλλοι. $\neg \exists x \forall y (x \neq y \rightarrow P(y, x))$
 $\forall x \exists y (x \neq y \wedge \neg P(y, x))$

Εκφράσεις Ελληνικής σε Πρωτοβάθμια Γλώσσα

- Απλές γλωσσικές δομές συνήθως επαρκούν.
- Κάθε αντικείμενο με ιδιότητα P $\forall x(P(x) \rightarrow Q(x))$ έχει ιδιότητα Q .
 - Ο επόμενος κάθε περιττού αριθμού είναι άρτιος. $\forall x(\text{odd}(x) \rightarrow \text{even}(x'))$
 $\text{even}(x) \equiv \exists y(x = 2 \otimes y)$ όπου $1 \equiv 0'$ και $2 \equiv (0')$
 $\text{odd}(x) \equiv \exists y(x = (2 \otimes y) \oplus 1)$
 - Κάθε πολλαπλάσιο του 4 είναι άρτιος. $\forall x(\exists y(x = 4 \otimes y) \rightarrow \text{even}(x))$
- Υπάρχει αντικείμενο με ιδιότητα P $\exists x(P(x) \wedge Q(x))$ και ιδιότητα Q .
 - Δεν είναι όλοι οι άρτιοι πολλαπλάσια του 4. $\exists x(\text{even}(x) \wedge \neg \exists y(x = 4 \otimes y))$

Εκφράσεις Ελληνικής σε Πρωτοβάθμια Γλώσσα

- Υπάρχει μοναδικό αντικείμενο με ιδιότητα P .
$$\exists x(P(x) \wedge \forall y(P(y) \rightarrow y = x))$$
- Υπάρχει μέγιστο (ελάχιστο) στοιχείο με ιδιότητα P .
 - Υπάρχει μοναδικός φυσικός που είναι μικρότερος του 1.
$$\exists x(x < 1 \wedge \forall y(y < 1 \rightarrow x = y))$$
- Το άθροισμα δύο περιπτών είναι άρτιος.
$$\forall x \forall y (\text{odd}(x) \wedge \text{odd}(y) \rightarrow \text{even}(x \oplus y))$$
- Ο x διαιρεί ακριβώς τον y :
$$D(x, y) \equiv \exists z(y = x \otimes z)$$
- Ο x είναι μικρότερος ή ίσος του y :
$$x \leq y \equiv \exists z(y = x \oplus z)$$
- Ο x είναι πρώτος αριθμός:
$$\text{prime}(x) \equiv (x \neq 0) \wedge (x \neq 1) \wedge \forall y \forall z (x = y \otimes z \rightarrow (y = x \vee z = x))$$

Εκφράσεις Ελληνικής σε Πρωτοβάθμια Γλώσσα

- Κάθε άρτιος μεγαλύτερος του 4 γράφεται ως άθροισμα δύο περιπτών πρώτων αριθμών (εικασία του Goldbach).
$$\begin{aligned} \forall x((\text{even}(x) \wedge 4 < x) \rightarrow \\ \rightarrow \exists y \exists z(\text{prime}(y) \wedge \text{odd}(y) \wedge \text{prime}(z) \wedge \text{odd}(z) \wedge x = y \oplus z)) \end{aligned}$$
- Για κάθε φυσικό αριθμό (έστω n), υπάρχει άλλος (έστω m) που είναι ο μέγιστος μεταξύ εκείνων που το διπλάσιό τους δεν ξεπερνά τον αρχικό (δηλ. το n).
$$\forall n \exists m(2 \otimes m \leq n \wedge \forall k(2 \otimes k \leq n \rightarrow k \leq m))$$

ή ισοδύναμα $\forall n \exists m(P(m, n) \wedge \forall k(P(k, n) \rightarrow k \leq m))$
όπου $P(m, n) \equiv 2 \otimes m \leq n$

Εκφράσεις Ελληνικής σε Πρωτοβάθμια Γλώσσα

- Ερμηνεία με σύμπαν **δυναμοσύνολο** πεπερασμένου **συνόλου S** , 2-μελές κατηγορηματικό σύμβολο Q με ερμηνεία $Q(x, y) \equiv x \subseteq y$, και **σταθερά c** που ερμηνεύεται ως το **κενό σύνολο** (\emptyset).
 - Υπάρχει σύνολο που περιέχει (ως υποσύνολα) κάθε σύνολο. $\exists x \forall y Q(y, x)$
 - Το κενό σύνολο έχει μόνο ένα υποσύνολο, τον εαυτό του. $Q(c, c) \wedge \forall x(Q(x, c) \rightarrow x = c)$
 - Για κάθε ζευγάρι συνόλων υπάρχει κοινό υποσύνολο που είναι το μεγαλύτερο δυνατό (τομή συνόλων).
$$\forall x \forall y \exists z [Q(z, x) \wedge Q(z, y) \wedge \forall w (Q(w, x) \wedge Q(w, y) \rightarrow Q(w, z))]$$
 - Για κάθε ζευγάρι συνόλων υπάρχει κοινό υπερσύνολο που είναι το ελάχιστο δυνατό (ένωση συνόλων).
$$\forall x \forall y \exists z [Q(x, z) \wedge Q(y, z) \wedge \forall w (Q(x, w) \wedge Q(y, w) \rightarrow Q(z, w))]$$

Σημασιολογική Προσέγγιση

- $A |= \phi[v]$: στην ερμηνεία A , η **αποτίμηση v** επαληθεύει (ή ικανοποιεί) τον **ϕ** .
 - **Αποτίμηση v** καθορίζει τιμές **ελεύθερων μεταβλητών** του ϕ και μόνο.
- $A |= \phi$: ο ϕ ικανοποιείται από κάθε αποτίμηση στην ερμηνεία A .
 - Ο ϕ αληθής στην A ή η ερμηνεία A αποτελεί **μοντέλο** για τον ϕ .
- $|= \phi$: ο ϕ ικανοποιείται σε κάθε ερμηνεία.
 - Ο ϕ είναι (λογικά) **έγκυρος** (αντίστοιχο **ταυτολογίας**).
 - Ταυτολογίες «δίνουν» λογικά έγκυρους τύπους με συντακτική αντικατάσταση.
- **Έγκυρότητα / ικανοποιησιμότητα / αλήθεια ϕ** ελέγχεται με εφαρμογή του **ορισμού αλήθειας** του Tarski.

Ορισμός Tarski

- Ερμηνεύει λογικούς συνδέσμους και ποσοδείκτες.
- Ορίζει ότι ένας **τύπος φ αληθεύει** (σε μια ερμηνεία A , για μια αποτίμηση v) ανν **το νόημα του εκφράζει μια αλήθεια στην A** .
- Η έννοια $A \models \phi[v]$ ορίζεται αναδρομικά ως εξής:
 - $A \models (x = y)[v]$ ανν $(v(x) = v(y))$.
 - $A \models Q(x_1, \dots, x_n)[v]$ ανν $((v(x_1), \dots, v(x_n)) \in Q^A)$.
 - $A \models \neg\psi[v]$ ανν $(\text{δεν ισχύει ότι } A \models \psi[v])$.
 - $A \models (\psi \wedge \chi)[v]$ ανν $(A \models \psi[v] \text{ και } A \models \chi[v])$.
 - $A \models (\psi \vee \chi)[v]$ ανν $(A \models \psi[v] \text{ ή } A \models \chi[v])$.
 - $A \models (\psi \rightarrow \chi)[v]$ ανν $(\text{όταν } A \models \psi[v], \text{ τότε } A \models \chi[v])$.
 - $A \models (\psi \leftrightarrow \chi)[v]$ ανν $(A \models \psi[v] \text{ ανν } A \models \chi[v])$.
 - $A \models \forall x\psi[v]$ ανν $(\text{για κάθε } a \in |A|, A \models \psi[v(x|a)])$.
 - $A \models \exists x\psi[v]$ ανν $(\text{υπάρχει } a \in |A| \text{ τέτοιο ώστε } A \models \psi[v(x|a)])$.

Παραδείγματα

- Δεν ακολουθούμε τον φορμαλισμό του ορισμού Tarski, αλλά την ουσία του.
- Ελέγχουμε αν πρόταση **αληθεύει σε συγκεκριμένη ερμηνεία**.
 - Απλά «**αποκωδικοποιούμε**» την πρόταση (στην συγκεκριμένη ερμηνεία) και **εξηγούμε πειστικά** αν αληθεύει ή όχι.
- Αληθεύουν οι παρακάτω προτάσεις στη δομή των **φυσικών** για $c = 0$ και $P(x, y) \equiv x \leq y$; Στην δομή των **ακεραίων**;
 - (α) $\forall x \forall y (P(x, c) \wedge P(c, y) \rightarrow P(x, y))$
 - (β) $\forall x (P(x, c) \rightarrow x = c)$
 - (α) αληθεύει σε **φυσικούς** και **ακέραιους**, (β) μόνο σε **φυσικούς**.

Παραδείγματα

- Δίνεται συγκεκριμένη πρόταση και ζητείται δομή που να (μην) την ικανοποιεί.
 - Δομή που ικανοποιεί παρακάτω προτάσεις **ταυτόχρονα**:
$$\forall x[Q(c, x) \rightarrow \exists y(x = f(y))] \qquad \neg \exists x(f(x) = c)$$
 - Δοκιμάζουμε φυσικούς, με $c = 0$, $Q(x, y) \equiv x < y$, και $f(x) = x+1$.
$$\forall x[x > 0 \rightarrow \exists y(y = x - 1)] \qquad \neg \exists x(x + 1 = 0)$$
 - Νδο παρακάτω πρόταση δεν είναι λογικά έγκυρη περιγράφοντας ερμηνεία της Γλώσσας Θ. Αριθμών που δεν την ικανοποιεί.
$$\forall x \exists y Q(x, y) \rightarrow \exists y \forall x Q(x, y)$$
 - Αν $Q(x, y) \equiv x < y$, υπόθεση αληθής και συμπέρασμα ψευδές!

Παραδείγματα

- Συνολοθεωρητική ερμηνεία με κατηγορηματικό συμβολο $Q(x, y)$ που αληθεύει ανν $x \in y$ (δηλ. το σύνολο y περιέχει ως στοιχείο το σύνολο x).
- Να ορίσετε το σύμπαν $|A|$ ώστε να αληθεύει η 1^η από τις παρακάτω προτάσεις και να μην αληθεύει η 2^η.

$\exists y \forall x \neg Q(x, y)$

$\forall x \forall y [x = y \leftrightarrow \forall z (Q(z, x) \leftrightarrow Q(z, y))]$

- Για να αληθεύει η 1^η, αρκεί να υπάρχει στο σύμπαν **σύνολο** που δεν περιέχει (ως στοιχείο) κανένα σύνολο που ανήκει στο σύμπαν.
 - Αυτό αληθεύει αν π.χ. $\emptyset \in |A|$.
- Για να μην αληθεύει η 2^η, αρκεί να υπάρχουν στο σύμπαν **δύο διαφορετικά σύνολα** που να περιέχουν (ως στοιχεία) **τα ίδια ακριβώς σύνολα** του σύμπαντος.
 - Π.χ. $|A| = \{ \emptyset, \{\{\emptyset\}\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}\} \}$

Παραδείγματα

- Ελάχιστο και μέγιστο πλήθος στοιχείων μιας δομής που αποτελεί μοντέλο για τις παρακάτω προτάσεις:
 - $\exists x \exists y (x \neq y) \quad |A| \geq 2$
 - $\forall x \forall y (x = y) \quad |A| = 1$
 - $\forall x \exists y \exists z \exists w (x \neq y \wedge x \neq z \wedge x \neq w) \quad |A| \geq 2$
 - $\exists y \exists z \exists w (y \neq z \wedge z \neq w \wedge y \neq w) \quad |A| \geq 3$
 - $\forall x \forall y \forall w (x = y \vee y = w \vee x = w) \quad |A| \in \{1, 2\}$

Λογική Εγκυρότητα

- Νδο $| = \varphi(c) \rightarrow \exists x \varphi(x)$
 - Θεωρούμε αυθαιρετη δομή A . $A | = \varphi(c) \rightarrow \exists x \varphi(x) \dots$
 - ... ανν όταν $A | = \varphi(c)$, υπάρχει $a \in |A|$ τ.ω. $A | = \varphi(a)$.
 - Ισχύει, αφού φ αληθεύει για στοιχείο όπου έχει αποτιμηθεί c .
- Νδο $| = \exists x \forall y P(x, y) \rightarrow \forall y \exists x P(x, y)$
 - Έστω αυθαιρετη δομή A . $A | = \exists x \forall y P(x, y) \rightarrow \forall y \exists x P(x, y) \dots$
 - ανν όταν (i) υπάρχει $a \in |A|$ τ.ω. για κάθε $\beta \in |A|$, $A | = P(a, \beta)$, τότε (ii) για κάθε $\gamma \in |A|$, υπάρχει $\delta \in |A|$ τ.ω. $A | = P(\delta, \gamma)$.
 - Ισχύει, αφού για κάθε $\gamma \in |A|$, $A | = P(a, \gamma)$ λόγω υπόθεσης.

Λογική Εγκυρότητα

- Νδο $| = \exists x(P(x) \rightarrow Q(x)) \rightarrow (\forall xP(x) \rightarrow \exists xQ(x))$
 - Θεωρούμε αυθαίρετη δομή A . Πρέπει νδο:
 - Αν (i) υπάρχει $a \in |A|$: $A | = P(a) \rightarrow Q(a)$,
 - τότε (ii) αν για κάθε $\beta \in |A|$, $A | = P(\beta)$,
 - τότε (iii) υπάρχει $\gamma \in |A|$: $A | = Q(\gamma)$.
 - Αρκεί νδο αν ισχύουν τα (i) και (ii), τότε ισχύει και το (iii).
 - Λόγω (i): υπάρχει $a \in |A|$: $A | = P(a) \rightarrow Q(a)$.
 - Λόγω (ii): $A | = P(a)$.
 - Άρα $A | = Q(a)$.
 - Συνεπώς, αν ισχύουν τα (i) και (ii), υπάρχει στοιχείο του $|A|$ για το οποίο αληθεύει το Q στην ερμηνεία A .

Λογική Συνεπαγωγή

- Έστω οι τύποι (1) $\forall x(f(x) = x \leftrightarrow Q(x))$, και
(2) $\forall x(f(x) = x) \leftrightarrow \forall xQ(x)$.
 - (α) Να βρείτε ποιος τύπος συνεπάγεται λογικά τον άλλο, και
 - (β) νδοι οι τύποι δεν είναι λογικά ισοδύναμοι.
- Θέο (1) \models (2) (αλλά όχι το αντίστροφο).
- Έστω αυθαίρετη ερμηνεία A. Από ορισμό Tarksi, αρκεί νδοι:
 - Αν (i) για κάθε $a \in |A|$, $A \models f(a) = a$ ανν $A \models Q(a)$,
τότε (ii.1) για κάθε $\beta \in |A|$, $A \models f(\beta) = \beta$ ανν
(ii.2) για κάθε $\gamma \in |A|$, $A \models Q(\gamma)$.
 - Διακρίνουμε 2 περιπτώσεις:
 - Ισχύει (ii.2), δηλ. για κάθε $\gamma \in |A|$, $A \models Q(\gamma)$ ανν,
λογω (i), για κάθε $\beta \in |A|$, $A \models f(\beta) = \beta$, ανν ισχύει (ii.1).
 - Δεν ισχύει (ii.2), δηλ. υπάρχει $\delta \in |A|$, $A \models \neg Q(\delta)$, ανν,
λόγω (i), υπάρχει $\delta \in |A|$, $A \models f(\delta) \neq \delta$, ανν δεν ισχύει (ii.2).

Λογική Συνεπαγωγή

- Έστω οι τύποι (1) $\forall x(f(x) = x \leftrightarrow Q(x))$, και
(2) $\forall x(f(x) = x) \leftrightarrow \forall xQ(x)$.
 - (α) Να βρείτε ποιος τύπος συνεπάγεται λογικά τον άλλο,
και (β) νδο οι τύποι δεν είναι λογικά ισοδύναμοι.
 - Ερμηνεία A που επαληθεύει τον (2) αλλά όχι τον (1).
 - $|A| = \{\alpha, \beta\}$, $f(\alpha) = \alpha$, $f(\beta) = \alpha$, και $Q(\alpha) \Psi, Q(\beta) A$.
 - Α μοντέλο για τον (2):
 - $A |= \neg \forall x(f(x) = x)$ και $A |= \neg \forall xQ(x)$
 - Α όχι μοντέλο για τον (1):
 - Υπάρχει στοιχείο του $|A|$, το α , για το οποίο
 $f(\alpha) = \alpha$ αλλά $Q(\alpha) \deltaεν\; aληθεύει$.

Kavonikή Ποσοδεικτική Μορφή

- Για κάθε τύπο φ , μπορούμε να βρούμε λογικά ισοδύναμο τύπο $\varphi^* \equiv Q_1 x_1 Q_2 x_2 \dots Q_n x_n \varphi'(x_1, \dots, x_n)$ όπου Q_i ποσοδείκτες και $\varphi'(x_1, \dots, x_n)$ ανοικτός τύπος.
 - φ^* αποτελεί **Kavonikή Ποσοδεικτική Μορφή (ΚΠΜ)** φ .
- Για υπολογισμό ΚΠΜ, χρησιμοποιούμε:
 - Νόμους μετακίνησης ποσοδεικτών (μόνο αν x **δεν** εμφανίζεται ελεύθερη στον φ):
$$\forall x \psi(x) \rightarrow \varphi \equiv \exists x (\psi(x) \rightarrow \varphi)$$
$$\exists x \psi(x) \rightarrow \varphi \equiv \forall x (\psi(x) \rightarrow \varphi)$$
$$\varphi \rightarrow \forall x \psi(x) \equiv \forall x (\varphi \rightarrow \psi(x))$$
$$\varphi \rightarrow \exists x \psi(x) \equiv \exists x (\varphi \rightarrow \psi(x))$$
 - Νόμους άρνησης ποσοδεικτών:
$$\neg \exists x \varphi(x) \equiv \forall x \neg \varphi(x)$$
$$\neg \forall x \varphi(x) \equiv \exists x \neg \varphi(x)$$
 - Νόμους κατανομής ποσοδεικτών:
$$\forall x (\varphi(x) \wedge \psi(x)) \equiv \forall x \varphi(x) \wedge \forall x \psi(x)$$
$$\exists x (\varphi(x) \vee \psi(x)) \equiv \exists x \varphi(x) \vee \exists x \psi(x)$$

Κανονική Ποσοδεικτική Μορφή

- Να βρείτε μια ΚΠΜ του τύπου

$$\begin{aligned} & \forall x(P(x, y) \rightarrow \neg \exists z Q(x, z)) \rightarrow (\forall x R(x) \wedge \forall y S(y)) \\ & \equiv \forall x(P(x, y) \rightarrow \neg \exists z Q(x, z)) \rightarrow \forall w(R(w) \wedge S(w)) \\ & \equiv \forall w[\forall x(P(x, y) \rightarrow \neg \exists z Q(x, z)) \rightarrow (R(w) \wedge S(w))] \\ & \equiv \forall w[\forall x(P(x, y) \rightarrow \forall z \neg Q(x, z)) \rightarrow (R(w) \wedge S(w))] \\ & \equiv \forall w \exists x[(P(x, y) \rightarrow \forall z \neg Q(x, z)) \rightarrow (R(w) \wedge S(w))] \\ & \equiv \forall w \exists x[\forall z(P(x, y) \rightarrow \neg Q(x, z)) \rightarrow (R(w) \wedge S(w))] \\ & \equiv \forall w \exists x \exists z[(P(x, y) \rightarrow \neg Q(x, z)) \rightarrow (R(w) \wedge S(w))] \end{aligned}$$