

# Σύνολα

---

Διδάσκοντες: **Φ. Αφράτη, Δ. Φωτάκης**  
Επιμέλεια διαφανειών: **Δ. Φωτάκης**

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών  
και Μηχανικών Υπολογιστών

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο



# Ορισμός Συνόλου

---

- Σύνολο είναι μια συλλογή διακεκριμένων αντικειμένων.
  - Π.χ. {Δημήτρης, Ανδρέας, Άρης}, {α, β}, {α, {α}, {{α}}},  
 $N = \{0, 1, \dots\}, \{1, 3, 5, 7, \dots\}, \{2, 3, 5, 7, 11, 13, \dots\}$
  - Αντικείμενα όχι κατ' ανάγκη ομοειδή  
π.χ. {Δημήτρης, 1, α, 1041, {α, β, γ}, {{}}, PC1}
  - Μέλη ή στοιχεία του συνόλου:  $x \in \{x, y, z\}$ ,  $a \notin \{x, y, z\}$
  - Κάθε αντικείμενο είτε είναι μέλος ενός συνόλου είτε όχι.
- Σύνολο ορίζεται:
  - με απαρίθμηση των στοιχείων του, π.χ. {α, β, γ}
  - με χαρακτηριστική ιδιότητα των στοιχείων του,  
π.χ.  $E = \{x \in N: x \text{ άρτιος}\}$ ,  $A = \{x \in U: P(x)\}$
  - ως αποτέλεσμα πράξεων σε σύνολα που έχουν ήδη ορισθεί.

# Ορισμός Συνόλου

---

- Στοιχεία ενός συνόλου:
  - Δεν επαναλαμβάνονται, π.χ.  $\{\alpha, \beta\}$  και όχι  $\{\alpha, \alpha, \beta\}$ .
    - Επανάληψη στοιχείων: **πολυσύνολα**.
  - Δεν έχουν διάταξη, π.χ.  $\{\alpha, \beta, \gamma\} = \{\gamma, \beta, \alpha\} = \{\beta, \alpha, \gamma\}$
- **Πληθικός αριθμός** συνόλου  $A$ : #στοιχείων  $A$ ,  $|A|$ .
  - Πεπερασμένα και άπειρα σύνολα.
- Σύνολα  $A$  και  $B$  **ταυτίζονται** ( $A = B$ ) ανν αποτελούνται από τα ίδια στοιχεία.

# Υποσύνολα και Κενό Σύνολο

---

- **Α υποσύνολο Β** (γράφουμε  $A \subseteq B$ ) αν κάθε στοιχείο του A ανήκει στο B:  $\forall x(x \in A \rightarrow x \in B)$ .
  - Π.χ.  $\{a, b\} \subseteq \{a, b, \dots, z\}$ ,  $\mathbb{N} \subseteq \mathbb{R}$ ,  $\{2, 4, 6, 8, 10\} \not\subseteq \{1, 2, 3, 4, 5\}$
  - Για κάθε σύνολο A,  $A \subseteq A$ .
  - Av  $A \subseteq B$ ,  $|A| \leq |B|$
  - $A = B$  ανν  $A \subseteq B$  και  $B \subseteq A$ .
  - Α γνήσιο υποσύνολο Β ( $A \subset B$ ):  $A \subseteq B$  και  $A \neq B$ .
- **Κενό σύνολο** ( $\{\}$  ή  $\emptyset$ ): σύνολο χωρίς κανένα στοιχείο.
  - $|\emptyset| = 0$ .
  - Για κάθε σύνολο A,  $\emptyset \subseteq A$  (απόδειξη;).
  - Κενό σύνολο είναι μοναδικό (απόδειξη;).

# Δυναμοσύνολο

- **Δυναμοσύνολο** συνόλου  $A$ ,  $P(A)$  ή  $2^A$ , είναι **σύνολο** με στοιχεία **όλα τα υποσύνολα** του  $A$ :  $P(A) = \{B : B \subseteq A\}$ 
  - $P(\{1, 2\}) = \{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{1, 2\}\}.$
  - $2^{\{\alpha, \beta, \gamma\}} = \{\emptyset, \{\alpha\}, \{\beta\}, \{\gamma\}, \{\alpha, \beta\}, \{\alpha, \gamma\}, \{\beta, \gamma\}, \{\alpha, \beta, \gamma\}\}$
  - $\emptyset \in P(A)$  και  $A \in P(A)$ , για κάθε σύνολο  $A$ .
  - $2^\emptyset = \{\emptyset\}$ .  $2^{P(\emptyset)} = ?$ .  $2^{P(\{\emptyset\})} = ?$ .
- Για κάθε πεπερασμένο σύνολο  $A$ ,  $|2^A| = 2^{|A|}$ .
  - Απόδειξη με επαγωγή και με συνδυαστικό επιχείρημα.
- $\subseteq$  και  $\in$ . Ποια από τα παρακάτω αληθεύουν;
  - $2 \in \{1, 2, 3\}$ .     $\{2\} \in \{1, 2, 3\}$ .     $2 \subseteq \{1, 2, 3\}$ .
  - $\{2\} \subseteq \{1, 2, 3\}$ .     $\{2\} \subseteq \{\{1\}, \{2\}\}$ .     $\{2\} \in \{\{1\}, \{2\}\}$ .

# Διαγράμματα Venn




- Αναπαριστούν σύνολα και σχέσεις μεταξύ συνόλων.
  - Διαγράμματα για σύνολα που έχουν κοινά στοιχεία αλλά όχι σχέση υποσυνόλου, ταυτίζονται, κλπ.


Ορθογώνιο αναπαριστά σύμπαν  $U$  που

περιέχει όλα τα αντικείμενα.

Ελλείψεις αναπαριστούν σύνολα υπό μελέτη.




# Διαγράμματα Venn



- Αναπαριστούν σύνολα και σχέσεις μεταξύ συνόλων.
  - Διαγράμματα για σύνολα που έχουν κοινά στοιχεία αλλά όχι σχέση υποσυνόλου, ταυτίζονται, κλπ.

$B$  (γνήσιο) υποσύνολο  $A$




# Διαγράμματα Venn



- Αναπαριστούν σύνολα και σχέσεις μεταξύ συνόλων.
  - Διαγράμματα για σύνολα που έχουν κοινά στοιχεία αλλά όχι σχέση υποσυνόλου, ταυτίζονται, κλπ.


$A$  και  $B$  δεν έχουν κοινά στοιχεία  
(ξένα μεταξύ τους)



# Πράξεις Συνόλων


---

- **Ένωση** συνόλων  $A$  και  $B$ ,  $A \cup B$ :
  - Σύνολο με στοιχεία που ανήκουν στο  $A$  ή στο  $B$  (ή και στα δύο).
  - Π.χ.  $\{1, 2, 3\} \cup \{2, 3, 4\} = \{1, 2, 3, 4\}$ .  
 $\{0, 2, 4, 6, \dots\} \cup \{1, 3, 5, 7, \dots\} = \mathbb{N}$ .
  - Αντιμεταθετική, προσεταιριστική,  $A \cup \emptyset = A$ ,  $A \cup A = A$ , ορίζεται η ένωση  $n \geq 2$  συνόλων.
  - $A \subseteq B$  ανν  $A \cup B = B$ .  
Ειδικά  $A \cup U = U$ .
  - $A \subseteq A \cup B$ , για κάθε  $B$ .
  - Av  $A, B \subseteq C$ , τότε  $A \cup B \subseteq C$ .




# Πράξεις Συνόλων

- **Τομή** συνόλων  $A$  και  $B$ ,  $A \cap B$ :
  - Σύνολο με κοινά στοιχεία  $A$  και  $B$ .
  - Π.χ.  $\{1, 2, 3\} \cap \{2, 3, 4\} = \{2, 3\}$ .  
 $\{0, 2, 4, 6, \dots\} \cap \{1, 3, 5, 7, \dots\} = \emptyset$
  - Αντιμεταθετική, προσεταιριστική,  $A \cap U = A$ ,  $A \cap A = A$ , ορίζεται η τομή  $n \geq 2$  συνόλων.
  - $A \subseteq B$  ανν  $A \cap B = A$ .  
Ειδικά  $A \cap \emptyset = \emptyset$ .
  - $A \cap B \subseteq A$ , για κάθε  $B$ .  
Αν  $A, B \subseteq C$ , τότε  $A \cap B \subseteq A \cup B \subseteq C$ .
  - Επιμεριστική ιδιότητα τομής ως προς ένωση και ένωσης ως προς τομή.
  - Αν  $A \cap B = \emptyset$ ,  $A$  και  $B$  **ξένα** ή **διαζευγμένα** σύνολα.



# Πράξεις Συνόλων


- **Διαφορά** συνόλου  $A$  από σύνολο  $B$ ,  $A - B$ :
  - Σύνολο με στοιχεία του  $A$  που δεν ανήκουν στο  $B$ .
  - Π.χ.  $\{1, 2, 3\} - \{2, 3, 4\} = \{1\}$ ,  
 $\{2, 3, 4\} - \{1, 2, 3\} = \{4\}$ ,  
 $\mathbb{N} - \{0, 2, 4, 6, \dots\} = \{1, 3, 5, 7, \dots\}$ .
  - Όχι αντιμεταθετική!
- **Συμπλήρωμα** συνόλου  $A$ ,  $\bar{A}$ :
  - Σύνολο με στοιχεία που δεν ανήκουν στο  $A$ ,  $U - A$ .
  - Συμπλήρωμα  $\emptyset = U$ .  
Συμπλήρωμα  $U = \emptyset$ .
  - $A - B = A \cap \bar{B}$



# Πράξεις Συνόλων


---

- **Συμμετρική διαφορά** συνόλων  $A$  και  $B$ ,  $A \oplus B$ :
  - Σύνολο με στοιχεία που ανήκουν **είτε στο  $A$  είτε στο  $B$**  αλλά **όχι και στα δύο**.
  - $A \oplus B = (A \cup B) - (A \cap B)$



# Διαμέριση Συνόλου

- Μη κενό σύνολο  $A$ . Συλλογή  $A_1, A_2, \dots, A_n$  μη κενών υποσυνόλων του  $A$  αποτελεί **διαμέριση** του  $A$  ανν:
  - $A = A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n$
  - Τα  $A_1, A_2, \dots, A_n$  είναι ανά δύο ξένα μεταξύ τους.
- Παραδείγματα:
  - Τα  $\{0, 2, 4, \dots\}$  και  $\{1, 3, 5, \dots\}$  αποτελούν διαμέριση του  $N$ .
  - Τα  $\{-1, -2, -3, \dots\}, \{0\}, \{1, 2, 3, \dots\}$  αποτελούν διαμέριση του  $Z$ .



# Ιδιότητες Πράξεων Συνόλων

---

Αντιμεταθετική	$A \cup B = B \cup A$ $A \cap B = B \cap A$
Προσεταιριστική	$A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C$ $A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C$
Επιμεριστική	$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$ $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$
Κανόνας συμπλήρωσης	$\overline{\overline{A}} = A$

# Ιδιότητες Λογικών Συνδέσμων (II)

Ουδέτερο στοιχείο	$A \cup \emptyset = A$ $A \cap U = A$
Απορροφητικό στοιχείο	$A \cap \emptyset = \emptyset$ $A \cup U = U$
Αυτοπάθεια	$A \cup A = A$ $A \cap A = A$
Κανόνας Απορρόφησης	$A \cup (A \cap B) = A$ $A \cap (A \cup B) = A$
Κανόνας De Morgan	$\overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}$ $\overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B}$

# Πράξεις Συνόλων

---

- Αντιστοιχία πράξεων συνόλων με λογικούς συνδέσμους.
  - Στοιχεία συνόλου A έχουν ιδιότητα (α).
  - Στοιχεία συνόλου B έχουν ιδιότητα (β).
  - Π.χ. στοιχεία συνόλου  $A \cup B$  έχουν ιδιότητα (α)  $\vee$  (β).
- Ιδιότητες πράξεων συνόλων και σχέσει μεταξύ συνόλων ελέγχονται / αποδεικνύονται με **membership tables**.
  - Πίνακες που εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα για το που ανήκει ένα στοιχείο.
  - Ισοδύναμο των **πινάκων αλήθειας**.
- Δείτε Liu, 1.1 και 1.2, Rosen, 1.4 και 1.5, και Epp, Κεφ. 5, για σύνολα, πράξεις συνόλων, και ιδιότητες.

# Παράδειγμα Membership Table

- Παράδειγμα membership table για επιμεριστική ιδιότητα της τομής ως προς την ένωση.

$A$	$B$	$C$	$B \cup C$	$A \cap (B \cup C)$	$A \cap B$	$A \cap C$	$(A \cap B) \cup (A \cap C)$
1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	0	1	1	1	0	1
1	0	1	1	1	0	1	1
1	0	0	0	0	0	0	0
0	1	1	1	0	0	0	0
0	1	0	1	0	0	0	0
0	0	1	1	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0

# Παραδείγματα

---

- Ν.δ.o.  $(A \cup B) \cap \overline{B} = A \Leftrightarrow A \cap B = \emptyset$ 
  - Αρκεί ν.δ.o.  $A - B = A$  ανν  $A \cap B = \emptyset$ , αφού
$$\begin{aligned}(A \cup B) \cap \overline{B} &= (A \cap \overline{B}) \cup (B \cap \overline{B}) \\ &= A \cap \overline{B} \\ &= A - B\end{aligned}$$
- Ν.δ.o.  $\overline{(A \cup B) \cap \overline{A}} = A$ 
$$\overline{(A \cup B) \cap \overline{A}} = \overline{\overline{A}} = A$$
- Ν.δ.o.  $P(A) \cap P(B) = P(A \cap B)$ .
- Ν.δ.o.  $P(A) \cup P(B) \subseteq P(A \cup B)$ . Να δώσετε παράδειγμα όπου το 1<sup>ο</sup> είναι γνήσιο υποσύνολο του 2<sup>ου</sup>.

# Παραδείγματα

---

□ Ν.δ.ο.  $(A - B) - C = A - (B \cup C)$

$$\begin{aligned}(A - B) - C &= (A \cap \overline{B}) \cap \overline{C} \\ &= A \cap (\overline{B} \cap \overline{C}) \\ &= A \cap (\overline{B \cup C})\end{aligned}$$

□ Ν.δ.ο.  $(A - B) - C = (A - C) - B$

■  $\begin{aligned}(A - B) - C &= A - (B \cup C) \\ &= A - (C \cup B) \\ &= (A - C) - B\end{aligned}$

# Παραδείγματα

---

- Ν.δ.ο.  $(A - B) - C = (A - C) - (B - C)$

$$\begin{aligned}(A - C) - (B - C) &= (A \cap \overline{C}) \cap (\overline{B} \cap \overline{\overline{C}}) \\&= (A \cap \overline{C}) \cap (\overline{B} \cup C) \\&= (A \cap \overline{C} \cap \overline{B}) \cup \overbrace{(A \cap \overline{C} \cap C)}^{=\emptyset} \\&= (A \cap \overline{B}) \cap \overline{C} \\&= (A - B) - C\end{aligned}$$