

# Γεννήτριες Συναρτήσεις

---

Διδάσκοντες: **Φ. Αφράτη, Δ. Φωτάκης**  
Επιμέλεια διαφανειών: **Δ. Φωτάκης**

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών  
και Μηχανικών Υπολογιστών

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο



# Αναπαράσταση Ακολουθιών

---

- **Ακολουθία:** αριθμητική συνάρτηση με πεδίο ορισμού το  $N$ .
- Με γενικό (ή «κλειστό») τύπο  $a_n$ :  $n$ -οστός όρος συναρτήσει  $n$ .
- Κωδικοποίηση σε δυναμοσειρά μιας (πραγματικής) μεταβλητής  $x$ .
- Γεννήτρια Συνάρτηση ( $\Gamma\Sigma$ )  $A(x)$  ακολουθίας  $\mathbf{a}$ :  $A(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 
  - Συντελεστής του  $x^n$  αντιστοιχεί σε  $n$ -οστό όρο ακολουθίας  $\mathbf{a}$ .
  - Επιλέγουμε διάστημα τιμών  $x$  ώστε **σειρά να συγκλίνει (πάντα!)**.
  - Έτσι θεωρούμε ότι  $A(x)$  **ἀπειρα παραγωγίσιμη** (αναλυτική).  
Παραγωγίζουμε/ολοκληρώνουμε την  $A(x)$  ως **πεπερασμένο άθροισμα**.
- Κάθε ακολουθία  $\mathbf{a}$  αντιστοιχεί σε μοναδική  $\Gamma\Sigma A(x)$ .
- $\Gamma\Sigma A(x)$  αντιστοιχεί σε μοναδική ακολουθία:  $a_n = (1/n!)A^{(n)}(0)$
- **Μετασχηματισμός** και «**αλγεβρικός**» **χειρισμός** ακολουθιών και επίλυση των προβλημάτων που κωδικοποιούν.

# Παραδείγματα

---

- ΓΣ ακολουθίας  $1, 1, 1, 1, \dots$  :  $1/(1 - x)$
- ΓΣ ακολουθίας  $a_n = b \lambda^n$  :  $b/(1 - \lambda x)$
- ΓΣ για πεπερασμένες ακολουθίες (υπόλοιποι όροι θεωρούνται 0).
  - ΓΣ ακολουθίας  $0, 0, 1, 2, 3, 4, 5$ :  $x^2 + 2x^3 + 3x^4 + 4x^5 + 5x^6$
  - ΓΣ ακολουθίας  $a_k = C(n, k)$ :  $(1 + x)^n$
- ΓΣ ακολουθίας  $a_n = n+1$  :  
$$\frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{\infty} x^n \Leftrightarrow \left( \frac{1}{1-x} \right)' = \left( \sum_{n=0}^{\infty} x^n \right)' \Leftrightarrow \frac{1}{(1-x)^2} = \sum_{n=0}^{\infty} nx^{n-1} = \sum_{n=0}^{\infty} (n+1)x^n$$
  - ΓΣ ακολουθίας  $\beta_n = n$  :  $B(x) = x/(1-x)^2$
- Ακολουθία που αντιστοιχεί σε  $\Gamma\Sigma A(x) = 5/(1 - 4x)$ :  $a_n = 5 \cdot 4^n$

# Παραδείγματα

---

- Ακολουθία αντιστοιχεί σε  $\Gamma\sum A(x) = 1/(1+x)$ ;
  - Γενικευμένο δυωνυμικό ανάπτυγμα (όταν  $n$  δεν είναι φυσικός):

$$(1+x)^n = 1 + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{n(n-1)\cdots(n-k+1)}{k!} x^k$$

- Ειδικότερα, αν  $n$  φυσικός:  $\frac{1}{(1-x)^n} = 1 + \sum_{k=1}^{\infty} \binom{n+k-1}{k} x^k$
- Δηλαδή η  $1/(1-x)^n$  είναι η  $\Gamma\sum$  για συνδυασμούς  $k$  από  $n$  αντικείμενα με επανάληψη (ή διανομή  $k$  ίδιων αντικειμένων σε η διακ. υποδοχές).
- Με βάση γενικευμένο δυωνυμικό ανάπτυγμα,

$$\frac{1}{1+x} = 1 + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)(-1-1)\cdots(-1-k+1)}{k!} x^k = 1 + \sum_{k=1}^{\infty} (-1)^k x^k$$

- Άρα η  $\Gamma\sum A(x) = 1/(1+x)$  αντιστοιχεί στην ακολουθία  $a_n = (-1)^n$

# Πράξεις Ακολουθιών

---

## □ Πράξεις μεταξύ ακολουθιών:

- Διαβάθμιση με συντελεστή  $c$ :  $(c\alpha)_n = c\alpha_n$
- Γραμμικός συνδυασμός:  $(c\alpha + d\beta)_n = c\alpha_n + d\beta_n$
- Δεξιά ολίσθηση κατά  $k$  θέσεις:

$$(S^k \alpha)_n = \begin{cases} 0 & \text{για } n = 0, \dots, k-1 \\ \alpha_{n-k} & \text{για } n \geq k \end{cases}$$

- Αριστερή ολίσθηση κατά  $k$  θέσεις:  $(S^{-k} \alpha)_n = \alpha_{n+k}$
- Ακολουθία μερικών αθροισμάτων:  $\gamma_n = \sum_{k=0}^n \alpha_k$
- Ακολουθία συμπληρωματικών μερικών αθροισμάτων:  $\delta_n = \sum_{k=n}^{\infty} \alpha_k$
- Ευθεία διαφορά:  $(\Delta \alpha)_n = \alpha_{n+1} - \alpha_n$
- Ανάστροφη διαφορά (ολίσθ. ευθείας 1 θέση δεξιά):  $(\nabla \alpha)_n = \alpha_n - \alpha_{n-1}$
- Συνέλιξη:  $(\alpha * \beta)_n = \sum_{k=0}^n \alpha_k \beta_{n-k}$

# Βασικές Ιδιότητες

---

- Γραμμική ιδιότητα:
  - Η ακολουθία  $c\alpha + d\beta$  έχει  $\Gamma\sum$  την  $cA(x) + dB(x)$ .
  - Η  $\Gamma\sum \frac{10-38x}{1-6x+8x^2} = \frac{1}{1-4x} + \frac{9}{1-2x}$  έχει ακολουθία την  $4^n + 9 \cdot 2^n$
  - Η  $\Gamma\sum \frac{9-47x}{1-10x+21x^2} = \frac{5}{1-3x} + \frac{4}{1-7x}$  έχει ακολουθία την  $5 \cdot 3^n + 4 \cdot 7^n$
- Ιδιότητα ολίσθησης:
  - Η ακολουθία  $S^k \alpha$  έχει  $\Gamma\sum$  την  $x^k A(x)$ , αφού:
$$x^k A(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \alpha_n x^{n+k} = \sum_{n=0}^{k-1} 0x^n + \sum_{n=k}^{\infty} \alpha_{n-k} x^n$$
  - Π.χ.  $0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, \dots$  έχει  $\Gamma\sum$  την  $x^4/(1-x)$   
 $0, 0, 1, 2, 4, \dots, 2^{n-2}$  έχει  $\Gamma\sum$  την  $x^2/(1-2x)$
  - Η ακολουθία  $S^{-k} \alpha$  έχει  $\Gamma\sum$  την  $x^{-k} \left( A(x) - \sum_{i=0}^{k-1} \alpha_i x^i \right)$
  - Π.χ. η ακολουθία  $a_n = 2^{n+3}$  έχει  $\Gamma\sum$  την
$$x^{-3} \left[ \frac{1}{1-2x} - 1 - 2x - 4x^2 \right] = \frac{8}{1-2x}$$

# Βασικές Ιδιότητες

---

- Μερικών αθροισμάτων:  $\gamma_n = \sum_{k=0}^n \alpha_k$ 
  - Παρατηρούμε ότι  $a_n = \gamma_n - \gamma_{n-1}$
  - Άρα  $A(x) = \Gamma(x) - x\Gamma(x) \Rightarrow \Gamma(x) = A(x) / (1-x)$ .
  - Π.χ.  $\gamma_n = n+1$  είναι ακολουθία μερικών αθροισμάτων της  $a_n = 1$ .
    - Άρα έχει  $\Gamma(x) = 1/(1-x)^2$
  - Ποια είναι η  $\Gamma$  της  $\beta_n = n(n+1)/2$ ?
    - Η  $\beta_n$  αποτελεί δεξιά ολίσθηση κατά 1 θέση της ακολουθίας μερικών αθροισμάτων της  $\gamma_n$ .
    - Άρα έχει  $\Gamma(x) = x/(1-x)^3$
- Συνέλιξη  $\alpha * \beta$  έχει  $\Gamma$  την  $A(x) B(x)$ .
  - Ο συντελεστής του  $x^n$  στο  $A(x) B(x)$  είναι  $(\alpha * \beta)_n = \sum_{k=0}^n \alpha_k \beta_{n-k}$
  - Ποια είναι η  $\Gamma$  της ακολουθίας  $\alpha_n = \sum_{k=0}^n 3^k 2^{n-k}$ 
    - Από ιδιότητα συνέλιξης,  $A(x) = 1/[(1-3x)(1-2x)]$

# Βασικές Ιδιότητες

---

## □ Ιδιότητα της Κλίμακας:

- Η ακολουθία  $\gamma_n = n \alpha_n$  έχει ΓΣ την  $\Gamma(x) = x A'(x)$ , αφού

$$\Gamma(x) = x A'(x) = x \sum_{n=0}^{\infty} (\alpha_n x^n)' = x \sum_{n=0}^{\infty} n \alpha_n x^{n-1} = \sum_{n=0}^{\infty} (n \alpha_n) x^n$$

- Η ακολουθία  $\delta_n = \alpha_n / (n+1)$  έχει ΓΣ την  $\Delta(x) = \frac{1}{x} \int_0^x A(z) dz$

$$\Delta(x) = \frac{1}{x} \int_0^x A(z) dz = \frac{1}{x} \sum_{n=0}^{\infty} \int_0^x \alpha_n z^n dz = \frac{1}{x} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\alpha_n}{n+1} x^{n+1} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\alpha_n}{n+1} x^n$$

# Παραδείγματα

---

- Ποια είναι η ΓΣ της ακολουθίας  $\beta = c a + d$ ;
  - $B(x) = c A(x) + d/(1-x)$
- Ποια είναι η ΓΣ της ακολουθίας  $\beta_n = c^n a_n$  ;
  - $B(x) = A(cx)$
- Ποια είναι η ακολουθία με ΓΣ την  $A(x) = 4x + 2/(1-3x)$  ;
  - $a_0 = 2, a_1 = 10, a_n = 2 \cdot 3^n$ , για  $n \geq 2$ .
- Ποια είναι η ακολουθία με ΓΣ την  $A(x) = 2/(1 - 4x^2)$  ;
  - Ανάλυση σε κλάσματα:  $A(x) = 1/(1-2x) + 1/(1+2x)$
  - Ακολουθία  $a_n = 2^n + (-2)^n$
- Ποια είναι η ακολουθία με ΓΣ την  $A(x) = \frac{22x^3 - 9x^2 - 14x - 1}{(1+x)(1+3x)(1-2x)^2}$ 
  - Ανάλυση σε κλάσματα:  $A(x) = \frac{1}{1+x} + \frac{1}{1+3x} - \frac{1}{1-2x} - \frac{2}{(1-2x)^2}$
  - Ακολουθία  $a_n = (-1)^n + (-3)^n - 2^n - (n+1)2^{n+1}$

# Εφαρμογές

---

- ... των ΓΣ είναι πολλές και σημαντικές. Μεταξύ άλλων:
  - Υπολογισμός αθροισμάτων.
  - Επίλυση προβλημάτων συνδυαστικής.
  - Επίλυση αναδρομικών εξισώσεων.
- Μεθοδολογία επίλυσης προβλημάτων:
  - Διατύπωση με βάση μια **ακολουθία** (ή συνδυασμό ακολουθιών) ώστε ο «κλειστός» τύπος για τον **n**-οστό όρο να δίνει τη λύση.
  - Υπολογισμός της ΓΣ της ακολουθίας (με βάση **ιδιότητες** ΓΣ).
  - **Ανάπτυγμα** ΓΣ και υπολογισμός έκφρασης για n-οστό όρο.
- Υπολογισμός αθροίσματος  $\sum_{k=0}^n 3^k 2^{n-k}$ 
  - ΓΣ αντίστοιχης ακολουθίας **a** είναι η  $A(x) = 1/[(1-3x)(1-2x)]$
  - Ανάλυση σε κλάσματα:  $A(x) = 3/(1-3x) - 2/(1-2x)$
  - Άθροισμα =  $a_n = 3^{n+1} - 2^{n+1}$

# Υπολογισμός Αθροισμάτων

---

- Υπολογισμός αθροίσματος  $\sum_{k=0}^n k^2$ 
  - Ακολουθία  $a_n = n$  έχει ΓΣ την  $A(x) = x/(1-x)^2$
  - Ιδιότητα κλίμακας:  $\beta_n = n^2$  έχει ΓΣ την  $B(x) = x(1+x)/(1-x)^3$
  - Άθροισμα αντιστοιχεί στην ακολουθία μερικών αθροισμάτων της ακολουθίας  $\beta$ , η οποία έχει ΓΣ την  $\Gamma(x) = x(1+x)/(1-x)^4$
  - Χρησιμοποιούμε  $(1-x)^{-4} = 1 + \sum_{k=1}^{\infty} \binom{4+k-1}{k} x^k = 1 + \sum_{k=1}^{\infty} \binom{k+3}{3} x^k$
  - ... και έχουμε:  $\frac{x^2}{(1-x)^4} = \sum_{k=1}^{\infty} \binom{k+1}{3} x^k$  και  $\frac{x}{(1-x)^4} = \sum_{k=1}^{\infty} \binom{k+2}{3} x^k$
  - Άθροισμα =  $\binom{n+1}{3} + \binom{n+2}{3} = \frac{(2n+1)(n+1)n}{6}$
- Ομοίως να υπολογισθεί το άθροισμα  $\sum_{k=0}^n k^3$

# Προβλήματα Συνδυαστικής

---

- **Συνήθεις ΓΣ** χρησιμοποιούνται για την κωδικοποίηση και επίλυση προβλημάτων **συνδυασμών**.
  - Για κάθε αντικείμενο  $A$ , κωδικοποιούμε στον εκθέτη της μεταβλητής  $x$  πόσες φορές μπορούμε να το επιλέξουμε.
    - $1+x+x^2+x^3+\dots+x^p$ : μπορούμε να επιλέξουμε το  $A$   $0, 1, \dots, p$  φορές (μπορεί άπειρο άθροισμα).
    - Σε αυτή τη φάση κωδικοποιούνται οι περιορισμοί.
    - Απαριθμητής για (επιλογές) αντικειμένου  $A$ .
  - Απαριθμητές για διαφορετικά αντικείμενα **πολλαπλασιάζονται** (κανόνας γινομένου) και δίνουν ΓΣ για συνδυασμούς από  $n$  αντικείμενα.
  - Ο **συντελεστής του  $x^k$**  στη ΓΣ αντιστοιχεί στον **#συνδυασμών  $k$**  από  $n$  αντικείμενα (υπό τους περιορισμούς που έχουμε θέσει).
  - Η ΓΣ κωδικοποιεί **όλα τα ενδεχόμενα** του πειράματος και **#τρόπων** να προκύψει κάθε ενδεχόμενο.

# Παραδείγματα

---

- Συνδυασμοί από η αντικείμενα χωρίς επαναλήψεις:
  - Απαριθμητής για κάθε αντικείμενο:  $1+x$
  - $\Gamma\sum (1+x)^n$ . Συντελεστής  $x^k = C(n, k)$ .
- Συνδυασμοί από η αντικείμενα με απεριόριστες επαναλήψεις:
  - Απαριθμητής για κάθε αντικείμενο:  $1+x+x^2+x^3+\dots = 1/(1-x)$
  - $\Gamma\sum 1/(1-x)^n$ . Συντελεστής  $x^k = C(n+k-1, k)$ .
- Συνδυασμοί από η αντικείμενα με απεριόριστες επαναλήψεις ώστε κάθε αντικείμενο να επιλεγεί τουλάχιστον 1 φορά:
  - Απαριθμητής για κάθε αντικείμενο:  $x+x^2+x^3+\dots = x/(1-x)$
  - $\Gamma\sum x^n/(1-x)^n$ . Συντελεστής  $x^k = C(k-1, n-1)$ .

# Παραδείγματα

---

- #λύσεων εξίσωσης  $z_1+z_2+z_3+z_4 = 30$  στους φυσικούς αν  $z_1$  άρτιος, θετικός  $\leq 10$ ,  $z_2$  περιπτώς  $\leq 11$ ,  $3 \leq z_3 \leq 10$ ,  $0 \leq z_4 \leq 15$ .
  - $A(x) = (x^2+x^4+\dots+x^{10})(x+x^3+\dots+x^{11})(x^3+x^4+\dots+x^{10})(1+x+x^2+\dots+x^{15})$
  - Ζητούμενο δίνεται από συντελεστή  $x^{30}$  που είναι 185.
  - Ο συντελεστής του  $x^{30}$  στην  $A(x)$  **δεν ταυτίζεται** με αυτόν στην  $A'(x) = (x^2+x^4+x^6+\dots)(x+x^3+x^5+\dots)(x^3+x^4+x^5+\dots)(1+x+x^2+x^3+\dots)$
- Κέρματα 20 λεπτών, 50 λεπτών, 1 ευρώ και 2 ευρώ.  
Συνδυασμοί με συνολική **αξία ή ευρώ** ώστε τουλάχιστον ένα κέρμα από κάθε είδος.
  - Κωδικοποιούμε στον εκθέτη την αξία των κερμάτων (σε λεπτά).
  - $A(x) = (x^{20}+x^{40}+\dots)(x^{50}+x^{100}+\dots)(x^{100}+x^{200}+\dots)(x^{200}+x^{400}+\dots)$
  - Το ζητούμενο δίνεται από τον συντελεστή του  $x^{100n}$

# Παραδείγματα

---

- #διανομών  $2n+1$  ίδιων μπαλών σε 3 διακεκριμένες υποδοχές ώστε κάθε υποδοχή να έχει  $\leq n$  μπάλες.

- Η ΓΣ είναι  $A(x) = (1+x+x^2+\dots+x^n)^3 = (1-x^{n+1})^3/(1-x)^3$
- Το ζητούμενο δίνεται από τον συντελεστή του  $x^{2n+1}$
- Με πράξεις:

$$\begin{aligned} A(x) &= (1 - 3x^{n+1} + 3x^{2n+2} - x^{3n+3}) \frac{1}{(1-x)^3} \\ &= (1 - 3x^{n+1} + 3x^{2n+2} - x^{3n+3}) \left( 1 + \sum_{k=1}^{\infty} \binom{k+2}{2} x^k \right) \end{aligned}$$

- Ο συντελεστής του  $x^{2n+1}$  είναι

$$\binom{2n+3}{2} - 3\binom{n+2}{2} = \frac{n(n+1)}{2}$$

# Παραδείγματα

---

- ΓΣ για τη διανομή **20 μαρκαδόρων**, 6 μαύρων, 10 πράσινων, και 4 κόκκινων, σε **2 καθηγητές** ώστε κάθε καθηγητής να πάρει **10 μαρκαδόρους** και τουλάχιστον 1 από κάθε χρώμα.
  - Διανομή στον  $1^{\circ}$  καθηγητή (σύμφωνα με περιορισμούς) καθορίζει τι θα πάρει ο  $2^{\circ}$  καθηγητής με **μοναδικό τρόπο**.
  - Αρκεί να διατυπώσουμε τη ΓΣ για τον  $1^{\circ}$  καθηγητή.
  - $(x+x^2+x^3+x^4+x^5)(x+x^2+\dots+x^9)(x+x^2+x^3)$
  - Το ζητούμενο δίνεται από τον **συντελεστή του  $x^{10}$**  που είναι **15**.

# Παραδείγματα

---

- 100 (μη διακεκριμένοι) επιβάτες κατεβαίνουν σε 4 (διακεκριμένες) στάσεις. Γεννήτρια Συνάρτηση όταν:
  - Δεν υπάρχουν περιορισμοί.
    - #ακεραίων λύσεων της  $z_1+z_2+z_3+z_4 = 100$  με  $z_1, z_2, z_3, z_4 \geq 0$ .
    - $(1+x+x^2+x^3+\dots)^4 = 1/(1-x)^4$
    - Ζητούμενο δίνεται από συντελεστή  $x^{100}$  που είναι C(103, 3)
  - #επιβ. 3<sup>η</sup> στάση  $\geq$  #επιβ. 2<sup>η</sup> στάση  $\geq$  #επιβ. 1<sup>η</sup> στάση.
    - Πρέπει  $z_2 = z_1 + \kappa$ ,  $\kappa \geq 0$ , και  $z_3 = z_2 + \lambda = z_1 + \kappa + \lambda$ ,  $\lambda \geq 0$ .
    - #ακεραίων λύσεων της  $3z_1 + 2\kappa + \lambda + z_4 = 100$  με  $z_1, \kappa, \lambda, z_4 \geq 0$ .
    - $(1+x^3+x^6+\dots+x^{99})(1+x^2+x^4+\dots+x^{100})(1+x+x^2+\dots+x^{100})^2$
    - Ζητούμενο δίνεται από συντελεστή  $x^{100}$  που είναι 30787

# Εκθετικές Γεννήτριες Συναρτήσεις

---

- ... για προβλήματα διατάξεων.
  - Διακεκριμένα αντικείμενα σε διακεκριμένες θέσεις.
  - Αναζητούμε τον συντελεστή τον συντελεστή του  $x^k/k!$   
(ουσιαστικά πολλαπλασιάζουμε τον συντελεστή του  $x^k$  με  $k!$ )
  - Λαμβάνουμε υπόψη διατάξεις στον σχηματισμό των απαριθμητών.
- Διατάξεις  $k$  αντικειμένων από  $n$  χωρίς επανάληψη.
  - $P(n, k) = C(n, k) \times k!$
  - Το  $P(n, k)$  προκύπτει ως συντελεστής του  $x^k/k!$  στο  $(1+x)^n$

$$(1 + x)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k = \sum_{k=0}^n \frac{n!}{(n - k)!k!} x^k = \sum_{k=0}^n \frac{n!}{(n - k)!} \frac{x^k}{k!}$$

# Εκθετικές Γεννήτριες Συναρτήσεις

---

- **Εκθετική Γεννήτρια Συν.**  $E(x)$  ακολουθίας **a**:  $E(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \alpha_n \frac{x^n}{n!}$ 
  - Συντελεστής του  $x^n/n!$  αντιστοιχεί σε **n**-οστό όρο ακολουθίας **a**.
- «**Εκθετική**» γιατί στην ακολουθία **1, 1, 1, ...** αντιστοιχεί η Εκθετική  $\Gamma\Sigma$  ( $\text{ΕΓΣ}$ ) **e<sup>x</sup>** λόγω της ταυτότητας:

$$e^x = 1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$$

- Εκθετικός απαριθμητής για μεταθέσεις η διαφορ. αντικειμένων: **x<sup>n</sup>**
- Εκθετικός απαριθμητής για μεταθέσεις η ίδιων αντικειμένων: **x<sup>n</sup>/n!**
- $\text{ΕΓΣ}$  για μεταθέσεις **η αντικειμένων σε k ομάδες** με ίδια αντικείμενα με πληθάριθμο ομάδων **n<sub>1</sub>, n<sub>2</sub>, ..., n<sub>k</sub>**:

$$\frac{x^{n_1}}{n_1!} \cdot \frac{x^{n_2}}{n_2!} \cdot \cdots \cdot \frac{x^{n_k}}{n_k!} = \frac{x^n}{n_1! \dots n_k!} = \frac{n!}{n_1! \dots n_k!} \cdot \frac{x^n}{n!}$$

# Παραδείγματα

---

- ΕΓΣ για διανομή κ διακεκριμένων αντικειμένων σε η διακεκριμένες υποδοχές χωρίς περιορισμούς και χωρίς να έχει σημασία η σειρά στις υποδοχές.
  - Ισοδύναμα, ΕΓΣ για διατάξεις κ από n με απεριόριστες επανάληψεις.
  - Εκθετικός απαριθμητής για κάθε υποδοχή:  $1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots = e^x$
  - Εκθετική ΓΣ:  $e^{nx}$  και ο συντελεστής  $x^k/k!$  είναι  $n^k$

# Παραδείγματα

---

- Το ίδιο με περιορισμό καμία υποδοχή να μην μείνει κενή ( $k \geq n$ ):
  - Εκθετικός απαριθμητής για κάθε υποδοχή:  $e^x - 1$
  - Εκθετική ΓΣ:  $(e^x - 1)^n$
  - Συντελεστής του  $x^k/k!$  είναι ίσος με  $\sum_{\ell=0}^n (-1)^\ell \binom{n}{\ell} (n-\ell)^k$
- Εφαρμογές:
  - Πρόγραμμα μελέτης 4 μαθημάτων για 7 ημέρες ώστε κάθε μάθημα να μελετηθεί τουλάχιστον 1 ημέρα.
    - «Διανομή» 7 διακ. ημερών σε 4 διακ. μαθήματα ώστε κανένα μάθημα να μην μείνει «κενό».
    - #«διανομών»:  $4^7 - 4 \times 3^7 + 6 \times 2^7 - 4 = 8400$
  - Ανάθεση 20 μεταπτ. φοιτητών σε 5 εργαστήρια ώστε κάθε εργαστήριο να δεχθεί τουλάχιστον 1 φοιτητή.
    - #«αναθέσεων»:  $5^{20} - 5 \times 4^{20} + 10 \times 3^{20} - 10 \times 2^{20} + 5$

# Παραδείγματα

---

- #πενταδικών συμβ/ρών μήκους  $n$  με άρτιο πλήθος από 1:
  - Εκθετικός απαριθμητής για καθένα από τα ψηφία 0, 2, 3, 4:

$$1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \cdots = e^x$$

- Εκθετικός απαριθμητής για ψηφίο 1:

$$1 + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + \frac{x^6}{6!} + \cdots = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$$

- Εκθετική ΓΣ:  $e^4(e^x + e^{-x})/2 = (e^{5x} + e^{3x})/2$
- Συντελεστής του  $x^n/n!$  είναι  $(5^n + 3^n)/2$

# Παραδείγματα

---

- #πενταδικών συμβ/ρών μήκους  $n$  με **άρτιο πλήθος 1** και **περιπτό πλήθος 0** όπου τα **2, 3, 4** εμφανίζονται **τουλάχιστον 1 φορά**.
  - Εκθετικός απαριθμητής για καθένα από τα ψηφία 2, 3, 4:  $e^x - 1$
  - Εκθετικός απαριθμητής για ψηφίο 1:  $(e^x + e^{-x})/2$
  - Εκθετικός απαριθμητής για ψηφίο 0:
$$\frac{x}{1!} + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + \frac{x^7}{7!} + \dots = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$$
- Εκθετική ΓΣ:  $(e^x - 1)^3 [(e^x + e^{-x})/2] [(e^x - e^{-x})/2]$
- Συντελεστής του  $x^n/n!$  είναι
$$5^n - 3 \times 4^n + 3^{n+1} - 2^n + (-2)^n - 3 \times (-1)^n - 1$$

# Παραδείγματα

---

- ΕΓΣ για διανομή κ διακεκριμένων αντικειμένων σε η διακεκριμένες υποδοχές χωρίς περιορισμούς και όταν έχει σημασία η σειρά στις υποδοχές.
  - Επειδή έχει σημασία η σειρά σε κάθε υποδοχή, κατά το σχηματισμό του απαριθμητή, πολλαπλασιάζουμε το  $x^k/k!$  με  $k$ !
  - Ο απαριθμητής για κάθε υποδοχή είναι:  $1+x+x^2+x^3 + \dots = 1/(1-x)$
  - Η (Ε)ΓΣ είναι  $1/(1-x)^n$
  - Το ζητούμενο δίνεται από τον συντελεστή του  $x^k/k!$ , που είναι:

$$\binom{n+k-1}{k} \times k! = \frac{(n+k-1)!}{(n-1)!}$$