



Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Διακριτές Μέθοδοι για την Επιστήμη των Υπολογιστών
Διδάσκοντες: Καθ. Φ. Αφράτη, Λεκτ. Δ. Φωτάκης
1η Σειρά Προτεινόμενων Ασκήσεων

Άσκηση 1 (Σύνολα και Διαγνωνιστική). (α) Συμβολίζουμε με $\mathcal{P}(A)$ το δυναμισύνολο ενός συνόλου A . Να χαρακτηρίσετε καθεμία από τις παρακάτω προτάσεις ως αληθή ή ψευδή. Αν μια πρόταση είναι αληθής, να διατυπώσετε μια σύντομη απόδειξη, διαφορετικά ένα αντιπαράδειγμα.

1. $A \cup \mathcal{P}(A) = \mathcal{P}(A)$
2. $A \cap \mathcal{P}(A) = A$
3. $\{A\} \cup \mathcal{P}(A) = \mathcal{P}(A)$
4. $\{A\} \cap \mathcal{P}(A) = A$
5. $A - \mathcal{P}(A) = A$
6. $\mathcal{P}(A) - \{A\} = \mathcal{P}(A)$

(β) Έστω \mathcal{S} το σύνολο όλων των πεπερασμένων υποσυνόλων του \mathbb{N} . Είναι το \mathcal{S} αριθμήσιμο; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

(γ) Έστω \mathcal{F} το σύνολο όλων των συναρτήσεων από το \mathbb{N} στο $\{0, 1, 2, 3\}$. Είναι το \mathcal{F} αριθμήσιμο; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

Άσκηση 2 (Μαθηματική Επαγωγή). (α) Να αποδείξετε ότι για κάθε φυσικό αριθμό $n \geq 1$,

$$1^2 + 2^3 + \cdots + n^3 = (1 + 2 + \cdots + n)^2$$

(β) Σε πόσες (μη επικαλυπτόμενες) περιοχές χωρίζουν το επίπεδο n ευθείες που ανά δύο δεν είναι παράλληλες και ανά τρεις δεν διέρχονται από το ίδιο σημείο; Να αποδείξετε τον ισχυρισμό σας με μαθηματική επαγωγή στον αριθμό των ευθειών n .

Άσκηση 3 (Μαθηματική Επαγωγή). Θεωρούμε n φίλους που ο καθένας ξέρει ένα διαφορετικό μυστικό και επικοινωνούν μεταξύ τους τηλεφωνικά ανά δύο. Κάθε φορά που δύο φίλοι μιλούν στο τηλέφωνο, ανταλλάσσουν όλα τα μυστικά που γνωρίζουν εκείνη τη στιγμή. Συμβολίζουμε με $A(n)$ τον ελάχιστο αριθμό τηλεφωνημάτων που απαιτούνται για να μάθουν όλοι οι φίλοι όλα τα μυστικά.

1. Να υπολογίσετε τα $A(2)$, $A(3)$, $A(4)$, και $A(5)$. Να περιγράψετε τις αντίστοιχες ακολουθίες τηλεφωνημάτων.
2. Να δείξετε ότι για κάθε φυσικό $n \geq 4$, $A(n) \leq 2n - 4$.

Άσκηση 4 (Αρχή Περιστερώνα).

(α) Να δείξετε ότι ανάμεσα σε $n + 2$ αυθαίρετα επιλεγμένους ακεραίους, είτε υπάρχουν δύο που η διαφορά τους διαιρείται από το $2n$ είτε υπάρχουν δύο που το άθροισμά τους διαιρείται από το $2n$.
(β) Έστω n αυθαίρετα επιλεγμένοι ακέραιοι a_1, a_2, \dots, a_n . Να δείξετε ότι υπάρχουν φυσικοί ℓ, k , $1 \leq \ell \leq n$, $0 \leq k \leq n - \ell$, τέτοιοι ώστε το άθροισμα $a_\ell + a_{\ell+1} + \cdots + a_{\ell+k}$ να διαιρείται από το n .